

SEP 1 1973

DIPTERA SCANDINAVIÆ


DISPOSITA ET DESCRIPTA.

Auctore

H. D:RE JOHANNE WILHELMO ZETTERSTEDT

AD UNIVERSITATEM LUNDENSEM BOTAN. ET OECON. PRACT.
PROFESS. REG. ET ORD. UNIVERSITATIS H. T. QUOQUE
RECTORE; EQUITE AURATO REG. ORDINIS DE WASA; REG.
ACAD. SCIENT. HOLM., SOCIET. ENTOMOL. PARIS., NATUR.
CURIOS. LIPS., SOCIET. CUVER. PARIS., SCIENTIAR. LITTE-
RARUMQUE ELEGANT. GOTHOB., PHYSIOGRAPH. LUND.,
CULTURÆ BOMBYCINÆ SUECANÆ HOLM., ENTOM. SCANDINAV.
HAFNIÆ, ET OECON. MALMOG., SODALI; REG. SOCIET. OECON.
BOTN. OCCIDENTALIS, SOCIETAT. HORTULANÆ GOTHO-
BURGENSIS ET SOC. PRO FAUNA ET FLORA FENNICA
HELSINGFORSIÆ, MEMBRO HONORIFICO; ATQUE
SOCIET. ENTOM. STETINI
CORRESPONDENTE.

TOMUS SEXTUS.


LUNDÆ,
EX OFFICINA LUNDBERGIANA,
SUMTIBUS REGIIS.

1847.

Hab. in Svecia meridionali & media rarius; scilicet in Scania ad Lund semel a me inventa; in Smolandia a D. Ljungh capta.

♀. Similis *D. flava* (22); nervis transversis magis approximatis diversa. A priori, cui quoque similis, magnitudine paullo minore & abdomine saturate flavo, nec nigro, discrepat. Tota flava, parum nitida, epistomate pedibusque adhuc pallidioribus. Setæ ordinariæ nigrae. Antennæ parvæ flavæ, seta pectinata nigra; superne radios 4—5 in exemplis haud bene conservatis numero. Seta mystacina nigra. Oculi mediocres l. majusculi rotundi, in mortua ferruginei. Abdomen oblongo-ovatum, saturate flavum l. testaceum, versus apicem dilute brunneum. Alæ hyalinae, nervis pallidis ut in priori directis. Nervus vero 2:us longitudinalis proportionem nonnihil longior, ita ut segmentum costæ 2:dum 3:tio fere duplo longius evadat. Halteres & pedes toti pallide flavi.

13. *D. congesta*: pallide flava; alis hyalinis, nervis transversis valde approximatis, segmento nervi longitudinalis 4:ti secundo tertio fere quadruplo breviori. ♂ (Long. $\frac{1}{4}$ lin.).

Hab. in Ostrogothia, ubi ad Lärketorp specimenu descriptum inveni.

♂. Differt a priore, cui alias valde similis, abdomine flavo, nec dilute brunneo, & imprimis nervis transversis adhuc magis approximatis. Tota pallide flava, setis ordinariis nigris. Antennæ parvæ flavæ, seta, quantum in individuo vetusto videri possit plumata. Seta utrinque mystacina distincta nigra. Oculi mediocres, rotundi, ferruginei. Alæ latiusculæ, nervis tenuibus haud pallidis. Nervus transversus evidenter approximatus, horum ostensius longissime a margine remotus, in disco alæ paullo ante medium insertus, medius nonnihil pone apicem auxiliaris ductus. Nervus 2:us longitudinalis solito in hoc genere brevior, ita ut segmentum costæ 2:dum 3:tio tantum $1\frac{1}{2}$ longius eva-

mas in unico exemplo communicatus. (E Finlandia a Prof. *Sahlberg* etiam olim missa).

♂♀. Colore totius corporis in utroque sexu flavo immaculato, a prioribus dignota. Parva, parum robusta, subopaca. Setæ ordinariæ nigrae. Frons lata flava. Antennæ parvæ, oblique exsertæ (non incumbentes), flavæ, articulo ultimo ovato, seta basi pectinata, versus apicem undique plumata, radii longiusculis nigris, non densis. Epistoma infra oculos non longe descendens, biimpressum, albo-micans, seta mystacina non valida, nigra. Genæ longiusculæ albidae. Oculi minusculi rotundi rufo-ferruginei. Thorax flavus, dorso vestigio lineolæ mediæ brunneæ, sed valde obsoletæ & parum conspiciendæ. Abdomen flavum, appendiculo supra anum sæpe fusco. Ala subhyalina irrisantes, nervis tenuibus flavis ut in præcedente directis, sed transversis forte nonnihil magis distantibus, ita ut segmentum nervi longitudinalis 4:ti ultimum antecedens longitudine parum ultra 1½ superet. Halteres albi. Pedes simplices, toti flavo-albidi, subnudi, femoribus anticis subtus ut solito parce pilosis.

4 23. *D. pallida*: pallide flava, pedibus dilutioribus, epistomate albicante; thoracis dorso flavo-canescente lineola media dilute brunnea obsoleta; alarum nervis transversis remotis, segmento nervi longitudinalis 4:ti ultimo antecedente 1¼ longiori. ♂. (Long. ½ lin.).

Dros. graminum var. d. Fall. Geomyz. 8. 11.

Hab. in graminosis per litus maris Baltici ad Esperöd Scaniæ mense Julio in 5 speciminibus a me capta.

♂. Inter minimas hujus generis. Similis priori, sed magnitudine paullo minori & thoracis dorso leniter canescente, nec pure flavo, differt. *Dr. Graminum* (15) quoque valde affinis,