

NNN 1553

CAROLI LINNÆI

EQUITIS DE STELLA POLARI,

ARCHIATRI REGII, MED. & BOTAN. PROFESS. UPSAL. 3

ACAD. UPSAL. HOLMENS. PETROPOL. BEROL. IMPER.

LOND. MONSPEL. TOLOS. FLORENT. SOC.

SYSTEMA  
NATURÆ

PER

REGNA TRIA NATURÆ,

SECUNDUM

CLASSES, ORDINES,  
GENERA, SPECIES,

CUM

CHARACTERIBUS, DIFFERENTIIS,  
SYNONYMIS, LOCIS.

TOMUS I.

---

EDITIO DECIMA, REFORMATA.

*Cum Privilegio S:æ R:æ M:tis Sveciæ.*

HOLMIÆ,

IMPENSIS DIRECT. LAURENTII SALVII,

1758.

- aralis. 60. M. antennis setariis pilosa nigricans, abdominis lateribus ferrugineis.  
*Habitat in Europa.*
- mite- 61. M. antennis setariis pilosa nigra, abdomine supra-  
 rum. glabro.  
*Habitat in Europa.*  
*Similis M. sepulchrali, sed paulo minor.*
- rialis. 62. M. antennis setariis pilosa cinerea, thorace maculis  
 quinque nigris, abdomine maculis tridentatis obsoletis.  
*Fn. suec. 1112.*  
*Habitat in Europa.*
- fenestra- 63. M. antennis setariis subpilosa atra, abdomine supra ru-  
 lis. goso strigis albis.  
*Habitat in Europa, frequens in fenestris.*
- roralis. 64. M. antennis setariis pilosa aterrima.  
*Habitat in Europa.*
- ferrata. 65. M. antennis setariis pilosa fusca, alarum costa pilis  
 brevissimis ferrata, abdomine pedibusque ferrugineis.  
*Habitat in Europa.*
- cellaris. 66. M. antennis setariis pilosa nigra, alis nervosis, oculis  
 ferrugineis. *Fn. suec. 1111.*  
*Habitat in cellis vinariis aliisque.*
- meteori- 67. M. antennis setariis pilosa nigra, abdomine subcinereo,  
 ca. alis basi subflavis, oculis brunneis.  
*It. wgoth. 37.*  
*Habitat in Europa, nebulae instar, ingruente imprimis  
 pluvia, ora Equorum obvolitantis. Amœn. acad. 3.  
 p. 358.*
- putris. 68. M. antennis setariis subpilosa atra, alarum costa nigra  
 oculis ferrugineis.  
*α. Fn. suec. 1110.*  
*β. Fn. suec. 1109.*
- casei. *Gœd. inf. 1. t. 73.*  
*Mer. eur. t. 43. f. 83.* *List. gœd. t. 132.*  
*Frisch. inf. 1. t. 7.*  
*Habitat α in Fimeticis, β in Caseo.*  
*He tres species adeo affines, ut difficulter distinguantur.*