

JOANNIS ANTONII SCOPOLI

MED. DOCT. S. C. R. ET APOST. MAIEST. MONTANUS

CIVITATIS IDRIÆ PHYSICI

ENTOMOLOGIA
CARNIOLICA
EXHIBENS
INSECTA
CARNIOLIÆ INDIGENA
ET
DISTRIBUTA IN ORDINES, GENERA,
SPECIES, VARIETATES.
METHODO LINNÆANA.



VINDOBONAE,

TYPI IS IOANNIS THOMAE TRATTNER,
CAES. REG. AVLÆ TYPogr. ET BIBLIOP.

MDCCLXIII.

1763

Lin. (3 $\frac{1}{2}$) longa, dimidiā cralla; antennis rufis; halteribus pallidis, alis immaculatis: costa venisque ferrugineis, genubus fascia nigra.

903. Musca Fungorum:

— long. lin. 1 $\frac{1}{2}$.

ROESEL. Musc. Tab. 8. fig. 3.

FRISCH. Inf. 3. Tab. 4. fig. 3. p. 15-16.

Diagn. Supra fuscescens, subtus, pedibusque pallidioribus; larva in *Agaricis* & *Boletis* habitans.

E *Boleto bovino* certius nascitur.

Larva albida, non saltatrix, capite fusco, abdominis apice bifido: segmentis decem, quorum margines pilis nigris brevibus ciliati; hinc *Musca* parvula, lineam & dimidiā longa, oculis castaneis, rostro halteribus concolore; occipitis tuberculo fuso; abdome oblongo, nitido, fuso: segmentis margine ferrugineis; halteribus nudis; alis hyalinis corpore longioribus: margine crassiore, venisque fuscis.

904. Musca Putris. (Casei.)

— long. lin. 1 $\frac{1}{2}$.

LINN. Syst. Nat. p. 597.

Faun. Svec. 2. 1850. 3.

FRISCH. Inf. 1. Tab. 7. fig. 4.

Diagn. Nigrescens, glabra; oculis ferrugineis; larva saltatrix in Caseo butyraceo molli & humidoire degens.

Habitat in caseo, quocum avide voratur a multis, quibus has delitias non invideo.

905. Musca Oenopota.

— long. lin. 1 $\frac{1}{2}$.

Diagn. Parvula, volitat circa orificia vasorum & doliorum vinariorum.

Habitat in cellis vinariis, & domibus advolans amphoris vino plenis, quo saepe immergitur, bibentium incommodo.

M. *Cellarem LINNAEI* esse nullus dubito, sed neque *setaria*, nec vere nigra. Oculi ferruginei & fere rubelli sunt, thorax æneo-fuscus: posuce tri-

bus ordinibus longitudinalibus pilorum brevium; minor *M. Fungorum*.

906. Musca Punctulata.

— long. lin. 5.

Diagn. Oculi ferruginei : fasciis duabus fulvis. Alæ nigræ : punctis rotundis albis variegatæ.

Circa *Idriam* capta.

Frons alba. Antennæ porrectæ, ferruginea, caput terminantes. Thorax pallide ferrugineus, punctulis fuscis sparsis minoribus, majoribusque in quatuor series longitudinaliter dispositis. Abdomen cinereum, oblongum, maculis nigris. Pedes pallidi : fascia obscuriore prope genua.

907. Musca Coleoptrata.

— long. lin. 1 $\frac{1}{2}$.

Diagn. Alæ arcuatæ, fuscescentes. Corpus nigrum. Os, thorax subtus pedesque albidi.

In fenæstra domus meæ capta 30. Aug.

Iners, superne nitens. Abdomen ellipticum. Alæ costa obscuriores, rigidulæ, arcuatæ, coleopteri adinstar. Genua postica nigra.

B. Setaria.

(*) *Seta terminali.*

908. Musca Muraria.

— long. lin. 1 $\frac{1}{2}$.

Diagn. Nigra ; fronte pilosa ; setulis antennarum capite longioribus.

Cursitat super nuros & turres, gregatim, Aprili M.

Duas lineas longa. Caput, parvum ; fronte & occipite erectis pilis barbato ; antennis obtusis, distinctis, brevibus ; thorace gibbo, non piloso ; halteribus pallide rufis : clava ovali ; alis hyalinis immaculatis ; cruribus nigris ; tibiis rufescentibus. Mas agilior, gracilior, in apice abdominis duo corpora uncinata inflexa gerens.

909. Musca Cursoria.

— long. lin. 1 $\frac{1}{2}$.

Diagn.