

# Bidrag till Svenska Dipternas k n- nedom;

af

**P. F. WAHLBERG.** (1839)

---

## 1.

Under den tid jag de sednare  ren egnat  t Entomologiens, och synnerligast de tv vingade Insecternas studium, har det lyckats mig antr ffa ett icke obetydligt antal i FALL NS *Diptera Sveci e* obeskrifna och  tskilliga alldeles ok nda arter,  fvensom jag  gt tillf lle iakttaga flera af dessas eller andras lefnadss tt, metamorfoser m. m., och d  jag under denna tid n stan endast unders kt Stockholms-trakten och den del af  sterg thlands kust, som gr nsar mot Calmare l n, f rn mligast omgifningarne af Gusums bruk i Ringarums socken, och s ledes blott allm nnare k nda delar af riket, har denna m ngd af f r oss nya f rem l ej kunnat annat  n vida  fvertr ffa min v ntan, samt hos mig v cka h g att efter f rm ga redovisa f r hvad jag funnit och iakttagit. Ett giltigt sk l har likv l hitintills afh llit mig h rifr n och best mmer  fven formen och omf nget af n rvarande bidrag. V r f rtjenst-

subporrectis nigro-fuscis, linea transversa frontis supra antennas et basi tarsorum rufis, stigmatum maculaque alarum apicali determinate nigris, halteribus nigro-fuscis.

Habitat ad Gusum cum prioribus, rarior.

*Mas et Femina.* Congeneribus paullo minor et antecedentibus angustior. Frons nigra, linea tantum transversa rufa supra antennas. Palpi cum proboscide nigri. Antennæ subporrectæ, angustiores et longiores, nigro-fuscæ. Abdomen fere glabrum. Pedes, basi tarsorum excepta, nigri. Alæ basi ad costam subinfuscatæ, stigmatum sine umbra adjacente nigro et macula, ut in *Ortalide vibrante*, determinata, subtriangulari, parva sed saturate nigra, omnino apicali, inter nervos 2 et 3 longitudinales sita, utrosque paullo superante.

4. *Ps. angustata*: sublinearis nigra subtilius punctata, antennis oblongis deflexis cum clypeo fuscis, stigmatum alarum lineari et macula apicali obsoleta et indeterminata fuscis, halteribus albidis.

Femina tantum unica ad Gusum 1837 capta.

*Femina.* *Ps. bimaculata* non brevior at multo angustior, sublinearis, magnitudine et statura *Sepsidis putris*. Tota nigra, antennis clypeoque tantum fuscis. Caput minus quam in ceteris depressum, quare oculi quoque magis globosi. Pedes toti nigri. Alæ hyalinæ, basi laud infuscatæ, stigmatum sine umbra adjacente, quam in ceteris magis lineari. Macula posterior alarum totum apicem occupat nervumque 4: tum transcendit quamvis diluta et indeterminata. A congeneribus non nihil recedit, certe tamen hujus generis.

## 11. *Drosophila alboguttata*.

*Dr. alboguttata*: ovata nigro-picea nitida pubescens, clypeo infra medium maculisque 2

thoracis utriusque lateralibus niveo-argenteis, antennis basi rufescentibus, proboscide pedibusque pallide testaceis, alis immaculatis.

Habitat in succo stillante *Quercus* cum aliis *Drosophilis* (*variegata* &c.) et *Milichiiis* ad Ur-säter prope Gusum, rarior, die 21 Junii 1837 capta.

*Mas et Femina.* *Drosophilæ glabræ* forma et magnitudine æqualis. Caput magnum; oculis tota latera occupantibus, vertice lato, nigro, opaco, longe at parce setoso distinctis. Clypeus infra oculos descendens, leviter emarginatus, vix impressus, medio obtuse carinatus, niveo-argenteus, supra sub antennis determinate niger. Genæ angustæ, pallidæ. Proboscis magna, albida. Palpi nigri. Antennæ subdeflexæ, articulis basalibus rufescentibus, ultimo magno, rotundato, nigro-fusco, seta ut in ceteris *Drosophilis* pectinata. Thorax convexus, magnus, postice setis aliquot longis armatus, nigro-piceus, maculis utrinque 2 parvis lateralibus, subrotundis, niveo-argenteis anteriori omnino scapulari, posteriori sub insertione alæ. Scutellum magnum, apice longe quadrisetosum. Abdomen longitudine thoracis, ano maris obtuso, femine vagina pilosa, apice bifida. Pedes pallide testacei, plus minus infuscati, pubescentes, intermedii ceteris fere majores; femoribus anticis subtus spinulosis; tibiis posticis subincurvatis. Alæ abdomen superantes, hyalinae, viridi-purpureo-micantes, pallide nervosæ, nervis ut in ceteris speciebus directis. Halteres capitulo niveo.